

ചീര : ശ്രദ്ധയുള്ള പരിപാലനം ഉല്ലാസത്തോടെ വിളവെടുപ്പ്



കൂടുതൽ മഴക്കാലം ഒഴികെ ചീര കൃഷി ചെയ്യാം. നല്ല വെയിൽ ലഭിക്കുന്നതും നിർവ്വായുള്ളതുമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു മീറ്റർ വീതിയിലും 20-30 സെ. മി ഉയരത്തിലും തറകൾ ഉണ്ടാക്കി 15-20 സെ.മി അകലത്തിൽ വരികളിൽ പൊടിമണലുമായി കലർത്തി വേണം വിത്ത് വിതരണം. മൂന്നാഴ്ച പ്രായമുള്ള (രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും.) തൈകൾ പരിചൂനടാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുവളപ്രയോഗത്തിനും നന്മയ്ക്കാനും ഉത്തമം.

ചീര നട്ടുപോൾ എല്ലാ പൊടി കോഴിവളം, ചാണകശ്യാടി എന്നിവ തടം ഒരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിവളമായി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ചീര വിത്ത് പാകി പരിച്ഛിന്നമാക്കണം. ചീരയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കണം. 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വാരത്തിൽ ആറ് ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ പരിച്ഛിന്നം. പരിച്ഛിന്നം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് നേരവും നനയ്ക്കണം. തൈനട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നു ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അവ നിവർന്നിനിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. ഉടൻ കമ്പോസ്റ്റ് വളം കൊടുക്കാം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഗോമൂത്രം ഒരു ലിറ്ററിന് 10 ലിറ്റർ വെള്ളം കലർത്തി നനയ്ക്കണം. 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കോഴിവളം ഗോമൂത്രത്തിൽ കുതിർത്ത് വിതറി നനയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ്. ചീരയ്ക്ക് പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് ഇലപ്പുള്ളി രോഗം. പച്ചച്ചീരയും ചുവന്ന ചീരയും ഇടക്കിലർത്തിനട്ടുന്നത് ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധിയാണ്. പച്ച ചാണക തളി, ഫിഷ് അമിനാ ആസിഡ് അഥവാ മീൻ വളം എന്നിവ ഇലയിൽ തളിയ്ക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. കൃഷി ചെയ്ത് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചീര വിളവെടുക്കാം.

റൂമ്പ് പൊടി വിതരണമല്ല രീതിയല്ല. ഇത് മണ്ണിനെ വർഷങ്ങളോളം വിഷമയമാക്കിത്തീർക്കും. ചീരയുടെ വിത്തിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടുകും കൂടി ചേർത്ത് വിതരണം. ഇത് പുഴുശല്യം വളരെയധികം കുറയ്ക്കും.

വളപ്രയോഗം

ചീരക്കു പച്ച ചാണകം വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കി നേർപ്പിച്ചു ഒഴിക്കുക. ചീര വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോൾ ചാണകം നിർമ്മിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ തടി ചി വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവും.

ചീരത്തെ നട്ടുമ്പോൾ ചാണകശ്യാടിയ്ക്കുക തന്നെ നട്ടുക. തൈകൾ വേര പിടിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചു തളിച്ചു കൊടുക്കാം.

ചുവന്ന ചീരയിൽ രോഗം അധികമായി കാണുമ്പോൾ പച്ച ചീര രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഇനമാണെന്നത് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ചുവന്ന ചീര തനിവിലായി കൃഷി ചെയ്യാതെ പച്ചച്ചീരയുമായി ഇടകലർത്തി കൃഷി ചെയ്യാൻ രോഗം സ്വാഭാവികമായും കുറയും.

■ ഇലകളിൽ വെള്ളം വീണ് സ്പോറുകൾ മറ്റു ചെടികളിലേയ്ക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ മാത്രം വെള്ളമൊഴിച്ചു നനയ്ക്കണം.

■ ഒരു കിലോ പച്ച ചാണകം 10 ലി. വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിഞ്ഞശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ 20 ഗ്രാം മാൻകൊസെബ് ചേർത്ത് ഇളക്കി തളിക്കുക. മരുന്ന് തളിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇവ കേഴിക്കാവൂ.

■ 40 ഗ്രാം സോഡാശ്യാടി മഞ്ഞൾശ്യാടി മിശ്രിതം (8 ഗ്രാം സോഡാശ്യാടി 32 ഗ്രാം മഞ്ഞൾശ്യാടിയുമായി കലർത്തിയത്); 40 ഗ്രാം പാൽക്കായം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയ ലായനിയിൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് മിശ്രിതങ്ങളും മാറിമാറി തളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. ഇലയുടെ രണ്ടുവശത്തും ലായനി പതിയ്ക്കും വിധം തളിക്കുക.

■ സൂര്യോദയംനേരം എന്ന ജൈവ കുമിൾ നാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വിത്ത് പരിചരിക്കാം.

■ ചീര നട്ടുന്നതിനായി ടൈക്കോഡെർമി എന്ന മിത്രകുമിൾ ഉപയോഗിച്ച് സമ്പന്നമാക്കിയ ചാണകം; വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മിശ്രിതം മണ്ണിൽ ചേർക്കുക.

വിത്ത് ഉറുപ്പ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ

വിത്തിന്റെ കൂടെ റവയും മണലും ഇടകലർത്തി പാകണം. ഉറുപ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വിത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണിത്. റവ ഉറുപ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾശ്യാടി വിതരണവും കീടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തെ തടയും.

വിത്ത് ഉറുപ്പ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ മണ്ണിൽ ഉ